

## Cryotherapie

Uw arts heeft u cryotherapie voorgesteld voor het behandelen van uw huidklachten. Over het algemeen wordt cryotherapie ingesteld voor bepaalde vormen van Actinische Keratose (ook wel zonbeschadigingen of voorloperstadia van huidkanker genoemd).

Cryotherapie kan ook worden voorgesteld voor pigmentvlekken of goedaardige bultjes, zoals wratten.

### De procedure

Cryotherapie is het bevriezen van de huidafwijkingen. Dit is over het algemeen wat pijnlijk, maar hoeft niet onder verdoving plaats te vinden.

Cryotherapie is niet gestandaardiseerd wat betreft frequentie, duur, intensiteit en specificatie van de temperatuur in het bevroren weefsel. Dit betekent dat vooraf nooit precies valt te bepalen hoe uitgebreid en effectief de werking/bijwerking kan zijn.

### Mogelijke bijwerkingen

Veel voorkomende bijwerkingen: pijn, roodheid, oedeem (opzwellen) en blaarvorming kan optreden tijdens en na de behandeling. Litteken en hypo- en hyperpigmentatie (dat is het ontstaan van een lichtere huidskleur of juist wat donkerdere huidskleur) wordt regelmatig gezien. De bijwerking van roodheid/blaarvorming en zwelling zijn tijdelijk (dagen tot 2 weken). De veranderingen in pigmentatie kunnen lange tijd aanwezig zijn en zijn soms blijvend.

### Het effect van de cryotherapie behandeling

De resultaten van de therapie zijn afhankelijk van de grootte en diepte van de huidafwijking en de individuele reactie van de patiënt op de bevrozing. In het geval van behandeling van Actinische Keratose, zal na de behandeling beoordeeld moeten worden of de huidafwijking voldoende is genezen.

Meldt het uw dokter als u de behandeling onprettig vindt of als u de behandeling liever op een ander tijdstip wilt laten plaatsvinden.

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u contact opnemen met MohsA telefoonnummer 088-1666111 of via [info@mohsa.nl](mailto:info@mohsa.nl).