

MOHS micrografische chirurgie - nazorg - informatie voor de patiënt

Inleiding

U heeft zojuist een Mohs micrografische ingreep ondergaan. In deze folder krijgt u enkele aanwijzingen over wat u thuis kunt verwachten en waar u op moet letten.

Adviezen bij thuiskomst

Om de kans op een nabloeding te verkleinen is het raadzaam de eerste 48 uur na de ingreep niet te bukken en te tillen. Verder is het aan te bevelen gedurende één tot twee weken rustig aan te doen en niet te sporten. De wond mag niet nat worden na de operatie, douchen is pas weer toegestaan als de hechtingen zijn verwijderd.

Voor een optimale genezing is het verstandig gedurende 2 weken na de ingreep niet te roken.

Wat te doen bij pijn?

Als u pijn heeft, neemt u 2 paracetamol tabletten van 500 mg, dit mag totaal drie keer per dag. Gebruik geen andere pijnstillers, omdat deze vaak een bloedverdunnende werking hebben en de kans op een nabloeding vergroten.

Risico's en complicaties

De eerste dagen na de operatie kan er rond het operatiegebied een rode of blauwe zwelling ontstaan. Dit komt vooral voor als u aan het voorhoofd, de wang of in de buurt van het oog bent geholpen. Dit is geen reden tot ongerustheid, tenzij dit samengaat met toenemende pijn en/of koorts. In dat geval neemt u contact op met MohsA.

Zoals bij iedere operatie bestaat de kans op een nabloeding. Om dit te voorkomen heeft u een drukverband gekregen. Het is belangrijk dat u dit drukverband laat zitten zolang als met u is afgesproken.

Als na de Mohs behandeling bij u thuis een nabloeding optreedt, is het belangrijk om rustig te blijven. Druk met een schone doek ongeveer 15 minuten stevig tegen de wond en verwijder vooral het verband **niet**. De bloeding zal in de meest gevallen stoppen. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met MohsA Huidcentrum.

Er bestaat een klein risico op een wondinfectie en eventueel koorts. Dit uit zich in toenemende pijn, roodheid en een kloppend gevoel rond de wond. Als dit gebeurt, neemt u contact op met MohsA Huidcentrum.

Wanneer neemt u contact op?

U neemt contact op met MohsA (088-1666111) als:

- U last krijgt van toenemende pijn of als u koorts krijgt;
- U last heeft van een nabloeding en deze na een kwartier afdrukken niet stopt.

Buiten kantooruren blijft u aan de lijn, u krijgt dan een keuzemenu. Als u de instructies volgt, wordt u doorgeschakeld naar de dienstdoende dermatoloog.

In een noodgeval tijdens de avond-, nacht- en weekend - uren kunt u ook contact opnemen met de dichtstbijzijnde Spoedeisende Hulp.

Controle wond

Afhankelijk van de wond en de grootte van het drukverband, komt u na enkele dagen terug om de wond te laten controleren. Deze controle vindt ook plaats als u een transplantaat of neustampon heeft gekregen.

De hechtingen worden meestal na een week verwijderd.

Tot slot

Het is niet ongebruikelijk dat u na de ingreep nog allerlei vragen heeft zoals over het ziekteverloop en het uiteindelijke (cosmetische) resultaat. Noteer deze vragen en neem ze mee bij het volgende bezoek. Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

MohsA Huidcentrum

088-1666111
info@mohsa.nl
www.mohsa.nl